多元函数微分学

曲面方程

- 直线、平面的方程，位置关系。
- 二次曲面的标准方程，柱面，锥面，旋转曲面 (习题 4.3: 6-13)。

求多元隐函数的偏导数

- 用公式法求 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$ 时, 应将 x, y, z 视为独立变量对 F 求偏导.
- 全微分法是通用的方法 (可用于求高阶偏导数): 将 $F(x, y, z) = 0$ 两边对 x, y 求导 (x, y 视为独立变量, z 视作 x, y 的函数), 可得 z'_x, z'_y 的方程组, 解之即得.
- 多元复合函数含有一个或多个中间变量, 求偏导时用链锁法则.
- 对多元函数求两阶以上偏导时, 中间变量对自变量的一阶偏导数仍是多元函数.

几何上的应用

- 空间曲线在某点处的切线和法平面方程。
- 空间曲面在某点处的切平面和法线方程。
- 方向导数。

多元函数的极值和最值

- 无条件极值: 取极值的必要条件和充分条件。若 $\Delta = B^2 - AC = 0$, 需通过定义判断驻点是否极值点 (例 5.7.2)。
- 条件极值: 化为无条件极值问题求解; 更一般的是利用拉格朗日乘数法求解。要注意的是: 拉格朗日乘数法所得到的点只是可疑极值点, 到底是否是极值点及其类型要通过充分条件判断。
- 最值: 设 $z = f(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 又设 $f(x, y)$ 在 D 内可偏导, 则 $f(x, y)$ 在 D 存在最大值 M 和最小值 m , 且它们或在 D 的边界上达到 (条件极值), 或在 D 内满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 的点 (即 $f(x, y)$ 的驻点) 处达到 (无条件极值)。如能确定最值肯定存在, 将上面所得函数值进行比较, 最大 (小) 者为最大 (小) 值。

二重积分

直角坐标下二重积分的计算

- 画出积分区域的图形, 确定积分上下限。
- 根据积分区域的形状及被积函数的表达式确定积分次序。对于积分式中含 $\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int \sin x^2 dx$, $\int e^{-x^2} dx$, $\int e^{\frac{y}{x}} dx$, $\int \frac{dx}{\ln x}$ 等形式的二重积分, 一般需改变积分次序后对 x 积分。

(2009年第一(8)题) 计算 $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} \sin^3 x dx$.

- 当被积函数为分段函数时，应根据分段函数的表达式将积分区域划分为若干子区域，使得在每个子区域上，被积函数的表达式唯一，如被积函数带有绝对值符号或含有最值符号 $\max$ 及 $\min$ 等需在子区域上去掉这些符号变为普通函数再积分。

$$(2009\text{年第七题}) \text{ 计算 } \iint_D f(x,y) dx dy. \text{ 其中 } f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & 0 \leq y \leq x, 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

而积分区域 $D = \{(x,y) | \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq 2\}$.

极坐标系下二重积分的计算

- 区域由圆（或其一部分）或由极坐标方程给出的曲线围成，且被积函数形如 $f(x^2+y^2)$, $f(\frac{x}{y})$.

交换二重积分的积分次序或化积分为累次积分

- 累次积分交换次序时，按以下顺序：由原累次积分的上、下限所确定的不等式组 $\rightarrow$ 区域 $D \rightarrow$ 建立另一组不等式组。

$$\begin{aligned} \text{改变积分 } I &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y) dx \\ &+ \int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x,y) dx \\ &+ \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x,y) dx \text{ 的积分次序.} \end{aligned}$$

- 注意对称性的运用：考虑对称性时，要兼顾积分区域和被积函数。

三重积分

坐标系的选取主要取决于积分域 Ω 的形状，利用对称性解题时要兼顾被积函数 $f(x,y,z)$ 的形式。

- 积分域为长方体、四面体等时，一般在直角坐标系下计算。
- 积分域为柱体或由柱面、锥面、旋转抛物面与其他曲面所围成的形体时，一般在柱坐标系下计算，

$$I = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

若 D_{xy} 为 Ω 在 xOy 平面上的投影，在 D_{xy} 内任取一点作平行于 z 轴的直线，与边界曲面的交点确定 z 的上下限。

- 积分域为球体或球体的一部分 - 锥体时，一般在球面坐标系下计算，

$$I = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta.$$

- 利用“先二后一”计算积分，例如 $f(x, y, z) = f(z)$ ，积分区域 Z 截面 D_z 的面积很容易计算。

(2007年第六题) 求曲环面：

$$x = (b + a \cos \psi) \cos \phi, y = (b + a \cos \psi) \sin \phi, z = a \sin \psi \quad (0 < a \leq b)$$

所界的物体体积。

- 采用“先一后二”时如何画出投影区域，确定上下顶面？

求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $2z - y = 3$ 所围成的立体的表面积。

- 利用对称性。

变量替换的微元分析法：

$$\iint_{\Omega_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{\Omega_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) \left| J \begin{pmatrix} x, y \\ u, v \end{pmatrix} \right| du dv, \text{ 其中 } J \begin{pmatrix} x, y \\ u, v \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix}.$$

- 平面极坐标：

$$J = r, \quad d\sigma = dx dy = r dr d\theta.$$

- 柱坐标：

$$dS = R d\phi dz, \quad dV = R dR d\phi dz.$$

- 球坐标：

$$dS = r^2 \sin \theta d\theta d\phi, \quad dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi.$$

曲线积分

1. 对弧长的曲线积分

- 首先画出积分路径的图形；然后将坐标参数化 $x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$, 计算积分

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'^2 + \psi'^2} dt.$$

2. 对坐标的曲线积分

- 化为参数的定积分求解, 设 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 则

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt,$$

其中 α 对应于 L 的起点, β 对应于 L 的终点。

- 若路径闭合, 可利用格林公式或斯托克斯公式求解, 但要注意公式的使用条件。若路径不闭合, 则加边使路径闭合, 然后使用格林公式。

- 应用格林定理时易出的差错 (例 7.3.3):

(1) 忽视 $P(x, y), Q(x, y)$ 在闭区域 D 上一阶偏导数的连续性;

(2) 忘记曲线 L 是封闭的, 并且是取正向。

被积函数	积分路径 c	积分值 I
$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$	$x = \cos\theta, y = \sin\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$	2π
	$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 正向	0
	$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 从 $(2, 1)$ 到 $(0, 1)$ 上半圆周	$\frac{\pi}{4}$
	$ x + y = 1$	2π

- 第一型与第二型曲线积分的关系:

(1) 不同之处: 曲线 L 有否方向, 以及积分微元的定义;

(2) 可以互化: 使切线方向与第二型曲线积分的积分曲线方向相同, 若在点 (x, y, z) 处切线的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$, 则有

$$dx = dl \cos \alpha, \quad dy = dl \cos \beta, \quad dz = dl \cos \gamma.$$

3. 曲面面积的计算法

计算方法	适用范围	基本形式
利用二重积分	已知曲面 Σ 的方程及其在坐标面上的投影域	设 $\Sigma: z = f(x, y)$ (与 // z 轴的直线只交于一点) 在 xoy 平面上的投影域为 D_{xy} , 则 Σ 的面积 $A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy, \Sigma$ 的其它形式有类似公式.
利用弧长的曲线积分	当曲面在某坐标面上的投影为一条曲线时, 通常用对弧长的曲线积分计算	<p>若曲线 L 上点的竖坐标是曲线 L 上点 $P(x, y)$ 的函数, 即 $z = f(x, y) (\geq 0),$ 则 $A = \int_L f(x, y) dl.$ </p>

附: 常见曲面方程

旋转曲面

设 L 是 xOz 平面上一条曲线 (如图 7.7), 其方程是 $\begin{cases} f(x, z) = 0, \\ y = 0. \end{cases}$ L 绕 z 轴旋转得到旋转曲面, 设 $P(x, y, z)$ 是旋转面上任一点, 由点 $P_0(x_0, 0, z_0)$ 旋转而来 (点 $M(0, 0, z)$ 是圆心).

由 $|x_0| = |\overrightarrow{MP_0}| = |\overrightarrow{MP}| = \sqrt{x^2 + y^2}, z_0 = z$ 得旋转面方程是

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0;$$
 或 由参数方程 $x = f(t), y = g(t), z = h(t) (t \in (\alpha, \beta))$, 得旋转面的参数方程

$$\begin{cases} x = \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} \cos \theta, \\ y = \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} \sin \theta, \\ z = h(t), \end{cases} \quad \alpha < t < \beta, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

柱面

Γ 是一条空间曲线, 直线 L 沿 Γ 平行移动所产生的曲面叫柱面, Γ 称为柱面的准线, L 叫柱面的母线.

▶1. 若准线方程是 $\Gamma: \begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$

(1) 当母线平行于 z 轴时, 柱面方程是 $f(x, y) = 0$;
 (2) 当母线的方向向量是 $S = \{l, m, n\}$ 时, 柱面方程是: $f(x - \frac{l}{n}z, y - \frac{m}{n}z) = 0$.

▶2. 若准线方程是 $\Gamma: \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t), t \in (\alpha, \beta), \\ z = h(t) \end{cases}$ 母线的方向向量是 $S = \{l, m, n\}$, 柱面方程是

$$\begin{cases} x = f(t) + lu, \\ y = g(t) + mu, \\ z = h(t) + nu \end{cases} \quad (\alpha < t < \beta, -\infty < u < +\infty).$$

二次曲面

曲面名称	方 程	曲面名称	方 程
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	旋转抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2p} = z \quad (p > 0)$
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p, q > 0)$	双曲抛物面	$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p, q > 0)$
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	抛物柱面	$\frac{x^2}{2p} = y \quad (p > 0)$